

ΕΘΝΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ

τῇ 23ῃ Αὐγούστου 1916.

Τὰ κυριώτερα συμπτώματα τῶν δι-
ληθηγισάσων εἶνε ἔμετοι, πόνοι καὶ
τὴν κοιλίαν, διάρροια, ψυχροὶ ἰδρώ-
ται καὶ συγκοπή. Δὲν πρέπει νὰ καταπο-
μῶμεν τοὺς ἐμέτους καὶ τὴν διάρροια
δίδου αὐτῇ ἡ φρῆσις γιναῖται διὰ τοῦ-
τὰ νὰ ἀπαλλοτῇ τοῦ δηλητηρίου. Ἀπεν-
αις πρέπει καὶ ἡμεῖς ἐνεργοῦντες νὰ
χρῆται νὰ διευκολύνωμεν τὸν ἔμε-
τον ἡ καὶ τὸν προκαλέσωμεν ἀκόμ-
τε γρηγορίωντες τὸν φράγμυν εἰτε μὲ τὸ
δόκτυλον εἰτε μὲ πτερὸν. Τὸ καλλίτερον
οἶμος εἶνε νὰ ἐξη κανεῖς εἰς τὸ σπῆ-
τον ἐν πρῶτῳ ἡμερικῶν, καὶ ὡς το-
σοῦτον εἶνε ἡ ἱεκακοῦνδά αἰς δόσις
1 1/2 γραμμαρίου διηρημένον εἰς

